



Restylane®

KYSSE™

DES LÈVRES

*Pulpeuses &
irrésistibles*

#InspiréParVous

LA COLLECTION
GALDERMA ESTHÉTIQUE

VOUS RÊVEZ DE LÈVRES GLAMOUR ET SENSUELLES MAIS VOUS CRAIGNEZ L'EFFET "BEC DE CANARD" ?



Les lèvres ont toujours été considérées comme l'une des caractéristiques les plus attrayantes du visage.¹



Des lèvres pulpeuses et bien dessinées créent un impact au premier regard.¹



SUBLIMEZ VOS LÈVRES ET RETROUVEZ UN SOURIRE EN HARMONIE
AVEC VOTRE VISAGE GRÂCE AUX INJECTIONS D'ACIDE HYALURONIQUE.



L'ACIDE HYALURONIQUE, PRODUIT DE RÉFÉRENCE DES INJECTIONS DES LÈVRES¹

L'acide hyaluronique est un composant naturellement présent dans la peau permettant de maintenir un bon niveau d'hydratation. Ses propriétés volumatrices et hydratantes en font le produit de comblement le plus utilisé dans le traitement des lèvres et de leur contour.^{1,2}

Les acides hyaluroniques n'ont cependant pas tous la même texture.³

RESTYLANE® KYSSE™, L'ACIDE HYALURONIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR VOS LÈVRES³

Le secret de Restylane® Kysse™ réside dans ses propriétés uniques alliant souplesse et fermeté, pour embellir vos lèvres tout en conservant leur apparence naturelle.³

Restylane® **KYSSE™**

REDESSINE, REPULPE ET RÉÉQUILIBRE
VOS LÈVRES POUR UN RÉSULTAT IRRÉSISTIBLE⁴

Restylane[®] KYSSE[™]

REDESSINER
LES CONTOURS

REDÉFINIR L'ARC
DE CUPIDON

APPORTER
DU VOLUME

100%

Des patients sont
SATISFAITS du **VOLUME**
de leurs lèvres ⁴

96%

Des patients trouvent
que leurs lèvres ont
une apparence **NATURELLE** ⁴

98%

Des patients trouvent
que leurs lèvres sont
IRRÉSISTIBLES ⁴

**DES LÈVRES IRRÉSISTIBLES
QUI SÉDUISENT AUSSI
VOTRE PARTENAIRE ⁴**

Étude post-AMM menée sur 59 sujets sains dans 3 centres au Canada pour évaluer l'amélioration des lèvres, leur apparence naturelle et la satisfaction du partenaire et du sujet après traitement à l'acide hyaluronique. Les sujets ont reçu soit une injection de Restylane[®] Kysse[™] (traitement des lèvres), ou des injections de Restylane Kysse et Restylane[®] Refyne et Defyne (traitement des lèvres et des rides et des plis péribuccales) une retouche si nécessaire a été faite à la semaine 4. Les évaluations ont été effectuées lors de l'examen préalable et de l'évaluation de base, ainsi qu'aux semaines 4 et 8 suivant la dernière injection des sujets. L'objectif principal était d'évaluer le degré d'amélioration esthétique du volume des lèvres en utilisant l'échelle globale d'amélioration esthétique (GAIS), 8 semaines après le traitement final avec (Restylane Kysse) par rapport à l'inclusion. Le critère principal étant le pourcentage des sujets qui ont noté l'amélioration de leurs lèvres «améliorée», «beaucoup améliorée», ou «très améliorée». Les objectifs secondaires comprenaient la satisfaction du partenaire (évaluée en se basant sur le questionnaire Kissability) et du sujet (évaluée en se basant sur le questionnaire Kissability et FACE-Q) vis-à-vis des lèvres, l'amélioration esthétique (évaluée par les investigateurs), et les effets indésirables. Les sujets et les investigateurs ont convenu que le traitement des lèvres avec Restylane[®] Kysse[™] a amélioré le volume des lèvres. Les partenaires ont également été satisfaits des lèvres des sujets après le traitement. Les événements indésirables liés au traitement ont été non graves, légers (96%) et transitoires.

DES LÈVRES QUI FASCINENT VOTRE PARTENAIRE PAR LEUR BEAUTÉ ET LE SÉDUISENT PAR LEUR SENSUALITÉ⁴



2 partenaires/**3**
déclarent que le baiser
est plus sensuel⁴



9 partenaires/**10**
sont satisfaits
du résultat⁴

COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT ?

Votre médecin injecte Restylane® Kysse™ en utilisant une aiguille fine ou une micro canule. Le volume injecté dépend des améliorations à apporter.

LE TRAITEMENT EST-IL DOULOUREUX ?

Pour favoriser votre confort pendant et après l'injection, Restylane® Kysse™ existe avec de la lidocaïne, un anesthésique local.

Avant le traitement, le médecin peut aussi appliquer une crème anesthésiante, ou suivant les besoins, pratiquer une anesthésie locale.

QUAND LES RÉSULTATS SERONT-ILS VISIBLES ?

Les effets sont visibles immédiatement.²

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES RÉSULTATS ?

Les effets peuvent durer jusqu'à 1 an.

QUEL EST LE NOMBRE DE SÉANCES NÉCESSAIRES ?

En général 1 seul traitement est suffisant. Des retouches peuvent être nécessaires pour atteindre l'effet recherché.

Restylane® **KYSSE™**

1. Popenko NA, Tripathi PB, Devic Z, Karimi K, Osann K, Wong BJF. JAMA Facial Plast Surg. 2017 Jul 1;19(4):261-267. doi:10.1001/jamafacial.2016.2049. PMID: 28208179; PMCID: 2. Ascher, B., Cerceau, M., Baspeyras, M., et al. Elsevier Masson, 2004. p. 465-485. 3. Données internes (MA-43049) 4. Bertucci, V., Nikolis, A., Solish, N., Lane, V., & Hicks, J. (2021). Journal of Cosmetic Dermatology.

Galderma respecte un niveau élevé d'exigence dans le développement et la commercialisation de ses produits. Cette exigence se traduit par :

- Une collaboration constante avec des médecins experts du monde entier.
- Un contrôle qualité permanent de ses produits.
- Des essais cliniques. La sécurité des produits est évaluée non seulement lors des essais cliniques préalables à leur commercialisation mais également tout au long de leur vie.


Restylane® Kysse™ Effets indésirables possibles : 1/1 000 - 1/10 000 : Gonflement. 1/10 000 - 1/50 000: Hématome, décoloration, érythème, infection, inflammation, ischémie/nécrose, masse, douleur/sensibilité, papules/nodules. 1/50 000 - 1/100 000 : Hypersensibilité, induration, symptômes neurologiques tels que paresthésies, prurit, courte durée de l'effet. < 1/100 000 : Abscès, acné, œdème de Quincke, atrophie/cicatrice, ampoules, troubles capillaires tels que télangiectasies, dermatite, déplacement de l'implant, fistule, granulome, éruption, réactivation d'un herpès, urticaire, troubles de la vue. Une atteinte vasculaire résultant d'injection intravasculaire accidentelle ou de la compression vasculaire due à l'implantation d'un produit injectable quel qu'il soit peut se manifester par un blanchissement, une décoloration, une nécrose ou une ulcération sur le site de l'implant ou dans la zone alimentée par les vaisseaux sanguins concernés ou bien rarement sous la forme d'événements ischémiques.

Ce dispositif médical est un produit réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Sweden. Distribués par Galderma International SAS, Tour Europlaza. 20, Avenue André Prothin. La Défense 4. 92927 LA DEFENSE CEDEX.

RES/002/02/2021 - © 2021 Galderma - Tous les droits sont réservés. Tous les éléments contenus dans ce document sont protégés par la législation relative aux droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, transmis, affichés, publiés ou diffusés sans autorisation préalable écrite de Galderma. Pour obtenir l'autorisation de réimpression ou des informations, veuillez adresser votre demande à «trademarks@galderma.com».

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DU PRODUIT POUR PLUS D'INFORMATIONS

 **Suivez-nous sur instagram :**
galdermafr_esthetique

 **GALDERMA**